XYLOCAINA GEL 2%

COMPOSICIÓN

Composición centesimal:
Lidocaína (D.C.I.) clorhidrato ..... 2,14 g
Excipientes: hidroxipropil metilcelulosa, metilparabén, propilparabén, ácido clorhídrico, hidróxido sódico y agua purificada c.s.p. ..... 100 g

PROPIEDADES

XYLOCAINA GEL 2% es un preparado para uso urológico. Tiene un elevado efecto anestésico superficial y una baja toxicidad. Es muy viscoso y transparente. Su alta viscosidad proporciona una distensión completa de la uretral masculina. El componente anestésico permanece así en contacto con toda la mucosa uretral, induciendo una anestesia prolongada. XYLOCAINA GEL 2% también actúa como un efectivo lubricante, permitiendo una clara visión citoscópica..

INDICACIONES

Anestesia urológica en procedimientos endouretrales.

CONTRAINDICACIONES

En pacientes hipersensibles a los anestésicos locales de tipo amida. Niños menores de 30 meses.

ADVERTENCIAS

Deportistas
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

EFECTOS SECUNDARIOS

Son extremadamente raras las reacciones alérgicas a la lidocaína y anestésicos locales del tipo amida.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Al igual que con otros anestésicos locales, debido a una excesiva dosificación o a una rápida absorción, en especial por la tráquea y árbol bronquial, que puede simular una inyección intravenosa lenta, pueden presentarse reacciones sistémicas que pueden afectar al SNC y al sistema cardiovascular. En estos casos el tratamiento será seguir la normativa general. En caso de sobredosificación o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológico. Teléfono 91 562 04 20.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

En el hombre: Tras desinfección del meato urinario, se deposita en él una gota de gel, introduciéndose a continuación la cánula montada sobre el tubo e inyectándose lentamente parte del contenido del tubo en la uretra, sin forzar y pinzando el meato urinario hasta que el paciente experimente una sensación de tensión, para ello generalmente se requieren de 7-10 ml. A continuación se aplica una pinza peneana a nivel de la corona del glande, durante algunos minutos administrando otros 10 ml de gel. La anestesia es completa en el plazo de 5-10 minutos. En los varones se requieren unos 20 ml de gel para una analgesia y lubricación adecuadas.
En la mujer: Tras desinfección local, se instilan unos pocos ml de gel en la uretra. Después se impregna un hisopo con el gel y se introduce en el orificio uretral para evitar el reflujo.
Dosificación máxima: Un tubo de 30 g en un periodo de tiempo de 12 h.

OBSERVACIONES

La administración de gel se efectúa de una sola vez, puede sin embargo ser renovada en caso de maniobras repetidas. Después de la instilación de un tubo de gel, su contenido no tiene garantías de esterilidad, por lo que la cantidad sobrante, debe ser desechada.

PRESENTACIÓN

Envase con 15 gramos.

USO TÓPICO

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Laboratorios INIBSA, Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5
08185 Lliçà de Vall BARCELONA